



ALGAEGROW

Fertilizante líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPONENTES	% P/V
Algas marinas (Ascophyllum Nodosum)	20.00 %
Aminoácidos	1.00 %
Fósforo (P2O5)	10.00 %
Potasio (K2O)	10.00 %
Aditivos, potencializadores y elementos relacionados	3.00 %



ALGAEGROW es un compuesto que cuenta con algas marinas (Ascophyllum nodosum), aminoácidos, activadores enzimáticos y nutrientes. El extracto de algas marinas contiene citocininas producidas de manera natural que aceleran y refuerzan los procesos fisiológicos de las plantas.

ALGAEGROW se recomienda utilizar para aumentar la producción y mejorar la calidad y color de las cosechas. Su aplicación más práctica es incrementar la resistencia de las plantas a condiciones adversas, por lo que es recomendado en cualquier etapa fenológica del cultivo para ayudarlo a salir de cualquier situación de estrés. El estrés puede presentarse principalmente por condiciones ambientales que pueden ser (heladas, granizadas, sequía, salinidad) y por condiciones deficientes de manejo (intoxicación por algún agroquímico, sobreproducción).

ALGAEGROW facilita la absorción de nutrientes y también mejora la penetración de productos fitosanitarios de uso común en el manejo agronómico de los cultivos. Puede ser parte de cualquier programa de fertilización foliar con excelentes resultados.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (Solanum tuberosum).	2,5 cc/L de agua (500cc a 1L /ha)	Aplicar desde el inicio de desarrollo hasta los 60 días de plantado. No aplicar después de este periodo porque puede inducir a floración.	Via Foliar
Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa), Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica), Frutilla (Fragaria), Pimiento (Capsicum annum).	2,5 cc/L de agua (500cc a 1L /ha)	Aplicar al inicio de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta el término de llenado	
Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis), Platano (Musa spp).	2,5 cc/L de agua (500cc a 1L /ha)	Aplicar al inicio de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta el término del llenado.	
Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).	2,5 cc/L de agua (500cc a 1L /ha)	Aplicar al inicio de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta el término del llenado.	
Maíz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).	2,5 cc/L de agua (500cc a 1L /ha)	Aplicar en tiempos de estrés, heladas, sequia, inundaciones y al inicio de las lluvias.	
Sandia (Citrus vulgaris), Papaya (Carica papaya).	2,5 cc/L de agua (500cc a 1L /ha)	Aplicar al inicio de floración y repetir cada 15 o 21 días hasta el término del llenado.	
Piña (Ananas comosus).	2,5 cc/L de agua (500cc a 1L /ha)	Aplicar a partir de los 8 días de la inducción, asperjando al fruto. Repetir cada 15 o 21 días hasta el término del llenado.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica"

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.



VIA FOLIAR

PRESENTACIONES

500 cc, 1 Litro, 4 Litros y 20 LITROS