



PRESENTACIONES

500 cc, 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros



Fertilizante líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	% P/V
NITROGENO	30%
FOSFORO	5%
POTASIO	5%
MAGNESIO	1355ppm
BORO	4310ppm
MANGANESO	305ppm
COBRE	187ppm
ZINC	500ppm
HIERRO	442ppm
MOLIBDENO	5ppm
AZUFRE	880ppm



FERTIGROW CRECIMIENTO es un fertilizante líquido con alto contenido de nitrógeno y microelementos que promueve un rápido desarrollo de la coloración verde oscura en las hojas, que se evidencia en el aumento de ramas fructíferas, en el florecimiento y número de yemas florales, en la formación de hojas verdes y brillantes, lo que dará mayor producción de almidón y de otros carbohidratos indispensables para la formación y el crecimiento de los frutos.

FERTIGROW CRECIMIENTO afecta directamente la síntesis de clorofila y el proceso de fotosíntesis. Contribuye a la síntesis de proteínas lo que se traduce en crecimiento de las hojas, aumentando la superficie fotosintética. Con su aplicación se favorece además la estructura general de la planta en cuanto a tallo y hojas (crecimiento vegetativo) lo que es crítico para una adecuada productividad. La acción de este producto se traduce en estimular la división celular, y en el proceso del alargamiento de las células formadas.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>).	5 cc/L de agua (1 L. 7ha)	Inicio etapa de Crecimiento.	Via Foliar
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>).	5 cc/L de agua (1 L. 7ha)	Inicio etapa de Crecimiento.	
Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Haba (<i>Vicia faba</i>), Brocoli (<i>Brassica oleracea var. italica</i>).	5 cc/L de agua (1 L. 7ha)	Aplicar desde la fase de desarrollo del cultivo.	
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Café (<i>Coffea arabica</i>), Naranja (<i>Citrus sinensis</i>).	5 cc/L de agua (1 L. 7ha)	Desde el establecimiento del cultivo.	
Aguacate (<i>Persea americana</i>), Manzana (<i>Malus pumila</i>), Tomate de Arbol (<i>Solanum betaceum</i>).	5 cc/L de agua (1 L. 7ha)	Desde el establecimiento del cultivo.	
Maíz (<i>Zea mays</i>), Arroz (<i>Oryza sativa</i>), Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>).	5 cc/L de agua (1 L. 7ha)	Inicio etapa de Crecimiento.	
Frutilla (<i>Fragaria</i>), Sandía (<i>Citrus/lus vulgaris</i>), Papaya (<i>Carica papaya</i>), Plátano (<i>Musa spp.</i>).	5 cc/L de agua (1 L. 7ha)	Inicio etapa de Crecimiento.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica".

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.