



PRESENTACIONES

500 cc, 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros



Fertilizante líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	% P/V
NITROGENO	5.00%
FOSFORO	5.00%
POTASIO	18.00%
MAGNESIO	1.333ppm
BORO	4.240ppm
MANGANESO	300ppm
COBRE	184ppm
ZINC	490ppm
HIERRO	434ppm
MOLIBDENO	5ppm
AZUFRE	864ppm



FERTIGROW ENGROSE es un producto desarrollo para las etapas de floración y sobre todo llenado de fruto, de fácil aplicación, incrementa la resistencia al frío o las heladas favoreciendo además la fructificación, maduración y calidad de los frutos.

FERTIGROW ENGROSE ayuda a resistir los ataques de enfermedades al fortalecer los mecanismos de resistencia naturales de la planta; tiene gran impacto en la calidad final del cultivo; refuerza la epidermis de la célula, permitiendo tener tallos fuertes que resisten el ataque de patógenos y plagas, cuya acción produce gran incidencia en el balance de agua y contribuye con el potencial osmótico, turgencia de células de estomas y procesos de transporte a través de membranas. Es vital para la fotosíntesis, con un efecto inmediato en la provisión de energía para el crecimiento vegetativo y la producción de la planta.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (Solanum tuberosum).	1 Litro / Ha.	Desde pre floración cada 15 días.	Via Foliar
Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa).	1 Litro / Ha.	En la fase de pre floración cada 15 días.	
Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica).	1 Litro / Ha.	En la fase de pre floración cada 15 días.	
Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis).	1 Litro / Ha.	Aplicar en el inicio de la fase floración del cultivo cada 15 días.	
Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).	1 Litro / Ha.	Antes del cuaje de flores cada 15 días.	
Maíz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).	1 Litro / Ha.	Aplicar a la formación de espigas cada 15 días.	
Frutilla (Fragaria), Sandía (Citrullus vulgaris), Papaya (Carica papaya), Platano (Musa spp).	1 Litro / Ha.	En la etapa de pre floración del cultivo.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica".

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.