

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	% P/V
NITROGENO	7.00%
FOSFORO	20.00%
POTASIO	10.00%
MAGNESIO	1.378ppm
BORO	4.380ppm
MANGANESO	310ppm
COBRE	190ppm
ZINC	507ppm
HIERRO	450ppm
MOLIBDENO	5ppm
AZUFRE	892ppm



FERTIGROW FLORACION es un compuesto elaborado para brindar un correcto abastecimiento de nutrientes para procesos de fecundación y floración de sus cultivos al intervenir directamente en la polinización y por lo tanto, en la posterior fructificación de la mayoría de especies cultivadas

Los elementos disponibles en **FERTIGROW FLORACION** brindan resistencia al frío y a las enfermedades, facilitan la fijación simbiótica de nitrógeno. Además, aseguran un correcto proceso de germinación de granos de polen, crecimiento del tubo polínico y formación de semillas y paredes celulares. Este producto mejora la calidad de la fruta, hortalizas y granos y es vital para la formación de semillas.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSES / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (Solanum tuberosum).	1 Litro / Ha.	Desde pre floración cada 15 días.	Via Foliar
Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa).	1 Litro / Ha.	En la fase de pre floración cada 15 días.	
Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica).	1 Litro / Ha.	En la fase de pre floración cada 15 días.	
Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis).	1 Litro / Ha.	Aplicar en el inicio de la fase floración del cultivo cada 15 días.	
Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).	1 Litro / Ha.	Antes del cuaje de flores cada 15 días.	
Maiz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).	1 Litro / Ha.	Aplicar a la formación de espigas cada 15 días.	
Frutilla (Fragaria), Sandía (Citrullus vulgaris), Papaya (Carica papaya), Platano (Musa spp).	1 Litro / Ha.	En la etapa de pre floración del cultivo.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica".

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.



PRESENTACIONES

500 cc, 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros