



PRESENTACIONES

500 cc, 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros



Fertilizante líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	% P/V
NITROGENO	5.00%
FOSFORO	25.00%
POTASIO	5.00%
MAGNESIO	1.333ppm
BORO	4.240ppm
MANGANESO	300ppm
COBRE	184ppm
ZINC	490ppm
HIERRO	434ppm
MOLIBDENO	5ppm
AZUFRE	864ppm



FERTIGROW INICIO es un complejo líquido que combina un suministro adecuado de macroelementos, esenciales para las plantas. Favorece un óptimo crecimiento inicial, una madurez adecuada, rápida formación y crecimiento de raíces, suministro de energía para el ciclo normal de producción, lo que es vital para rendimientos más altos y mejor calidad de los cultivos.

FERTIGROW INICIO al estar combinado con componentes orgánicos favorece también la movilización y liberación de nutrientes para su mayor disponibilidad en el suelo, lo que tiene un efecto directo sobre raíces y tallos de las plantas en todas sus etapas.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>).	1 Litro /Ha	En la fase inicial cada 15 días.	Via Foliar
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>).	1 Litro /Ha	A los 5-8 días de sembrado, repetir a los 15 días.	
Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Haba (<i>Vicia faba</i>), Brocoli (<i>Brassica oleracea var. italica</i>).	1 Litro /Ha	A los 5-8 días de sembrado, repetir a los 15 días.	
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Café (<i>Coffea arabica</i>), Naranja (<i>Citrus sinensis</i>).	1 Litro /Ha	Desde el establecimiento del cultivo.	
Aguacate (<i>Persea americana</i>), Manzana (<i>Malus pumila</i>), Tomate de Arbol (<i>Solanum betaceum</i>).	1 Litro /Ha	Aplicar desde el establecimiento del cultivo.	
Maiz (<i>Zea mays</i>), Arroz (<i>Oryza sativa</i>), Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>).	1 Litro /Ha	En el inicio del cultivo en intervalos de 15 días.	
Frutilla (<i>Fragaria</i>), Sandía (<i>Citrus/lus vulgaris</i>), Papaya (<i>Carica papaya</i>), Plátano (<i>Musa spp.</i>).	1 Litro /Ha	Durante el establecimiento o trasplante del cultivo, cada 15 días.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica".

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.