

GIBERGROW

Fertilizante líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	% P/V
Giberelinas	40000 ppm
Citocininas	1200 ppm
Nitrógeno (N)	3%
Fósforo (P)	8%
Potasio	14%
Aminoácidos	10,00%



GIBERGROW es un compuesto fitohormonal a base de GA3 potencializado con fósforo, potasio, ácidos orgánicos, aminoácidos, vitaminas, activadores enzimáticos, que promueven una mayor asimilación y mayor sinergia. Este producto tiene una función crítica en el proceso de alargamiento de las células formadas, por lo que su aplicación es efectiva para estimular la tasa de crecimiento en los órganos de la planta.

La acción de **GIBERGROW** radica en estimular y promover la elongación celular, con lo que se desarrollan cultivos de mayor tamaño y gran calidad.

GIBERGROW en etapas tempranas acelera el desarrollo vegetativo y le da a la planta mayor capacidad en tiempos de estrés. Induce el despertar de yemas o brotes, en ramas y tubérculos. En diversos frutos el tejido carnoso crece por división y alargamiento celular, en lo cual participan varias hormonas que permiten incrementar el potencial de los cultivos de expresar frutos de mayor tamaño, obteniendo así mayor rentabilidad en el ciclo. La aplicación de este producto en cultivos específicos durante la fase de división celular (desarrollo vegetativo) del fruto estimula el crecimiento del mismo. Otros usos específicos incluyen retrasar el tiempo de floración y la senescencia en cítricos y estimular la brotación en semillas de papa, con el fin de que la cosecha tenga mejor precio en el mercado.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	125 cc/L de agua (250 ml / ha)	Para estimular el desarrollo de brotes, aplicar al momento de la siembra asperjando los tubérculos y tapando.	Vía Foliar
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Haba (<i>Vicia faba</i>), Brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), Frutilla (<i>Fragaria</i>), Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>),	125 cc/L de agua (250 ml / ha)	Para promoción del desarrollo vegetativo aplicar desde 15 a 20 días después del transplante.	
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Café (<i>Coffea arabica</i>), Naranja (<i>Citrus sinensis</i>), Plátano (<i>Musa spp</i>), Sandía (<i>Citrus/lus vulgaris</i>),	125 cc/L de agua (250 ml / ha)	Para incremento del tamaño del fruto aplicar directamente cuando los frutos tengan de 3 a 4 cm de diámetro. Repetir a los 15 días.	
Aguacate (<i>Persea americana</i>), Manzana (<i>Malus pumila</i>), Tomate de Árbol (<i>Solanum betaceum</i>),	125 cc/L de agua (250 ml / ha)		
Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>).	125 cc/L de agua (250 ml / ha)	Para estimulación del crecimiento aplicar en etapas iniciales en planta en etapa de pello y durante el desarrollo.	
Papaya (<i>Carica papaya</i>),	125 cc/L de agua (250 ml / ha)	Para el despertar de yemas, un mínimo de dos aplicaciones.	
Maíz (<i>Zea mays</i>),	125 cc/L de agua (250 ml / ha)	Para promoción del crecimiento de los tallos formados durante el inicio del amacollamiento y el inicio del llenado del grano.	



PRESENTACIONES

250 ml, 500 ml, 1 Litro y 4 Litros