

ENRIQUECIDO CON CITOQUININAS Y VITAMINAS

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPONENTES	% P/V
Cytoquininas	1500 ppm
Mangnesio (MgO)	0,800%
Boro (B)	0,110%
Hierro (Fe)	0,300%
Zinc (Zn)	0,330%
Manganeso (Mn)	0,250%
Cobre (Cu)	0,130%
Molibdeno (Mo)	700 ppm
Acido Ascórbico	3400 ppm
Acido Fólico	0,170%



GROWCYT es un bioestimulante líquido de amplio espectro que ayuda al crecimiento de las células de las plantas de gran eficiencia en el fortalecimiento de los procesos fisiológicos de las plantas favoreciendo el incremento en las cosechas.

Los ingredientes y el diseño en su formulación benefician el desarrollo (crecimiento y diferenciación) armónico de los tejidos.

Se incrementa la floración así como el tamaño y consistencia de los frutos al aplicar **GROWCYT** en etapa productiva. Regula la brotación de yemas laterales adicionales.

Al utilizarse **GROWCYT** sobre el cultivo participa de forma directa en la reducción de los procesos degradativos del envejecimiento natural o anticipado (agente anti-senescencia o anti-envejecimiento). Como resultado, mantiene por más tiempo la condición funcional del tejido y permite con ello que el cultivo prolongue su vida.

GROWCYT impulsa una estimulación celular, por lo que es vital acompañar su uso con la incorporación de nutrientes, dependiendo de cuales sean los fines de la estimulación. Para mejorar el tamaño, mejor uniformidad, con frutos de mayor calidad, mayor porcentaje de cosechas de primera y producto con calidad de exportación, con más valor en el mercado, evitando la caída de flores y frutos y evitar la senescencia se recomienda complementar con aplicaciones de **NUTRIGROW FOSFORO**.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	1,25-2,5 cc/L de agua (250-500 ml/ha)	Aplicar al inicio de floración y repetir cada 15 días	Vía Foliar
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Haba (<i>Vicia faba</i>), Brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. italiana), Frutilla (<i>Fragaria</i>), Pimiento (<i>Capsicum annum</i>), Sandía (<i>Citrus vulgaris</i>)	1,25-2,5 cc/L de agua (250-500 ml/ha)	Aplicar al inicio de floración y repetir cada 15 días	
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Café (<i>Coffea arabica</i>), Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)	1,25-2,5 cc/L de agua (250-500 ml/ha)	Estimulación de floración y desarrollo de fruto. Aplicar al inicio de la floración y repetir a los 15 días.	
Aguacate (<i>Persea americana</i>), Manzana (<i>Malus pumila</i>), Tomate de Arbol (<i>Solanum betaceum</i>),	1,25-2,5 cc/L de agua (250-500 ml/ha)	Aplicar en maíz cuando las plantas tengan de 6 a 9 hojas extendidas.	
Maíz (<i>Zea mays</i>),	1,25-2,5 cc/L de agua (250-500 ml/ha)	Aplicar al inicio. Estimulación de floración.	
Arroz (<i>Oryza satina</i>),	1,25-2,5 cc/L de agua (250-500 ml/ha)		
Papaya (<i>Carica papaya</i>), Plátano (<i>Musa spp.</i>)	1,25-2,5 cc/L de agua (250-500 ml/ha)		
Piña (<i>Ananas comosus</i>),	1,25-2,5 cc/L de agua (250-500 ml/ha)	Aplicar aproximadamente a los 90 días de inducidas las plantas, al momento de tirado de pétalos, repitiendo la dosis entre los 15 y 21 días.	
Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>).	1,25-2,5 cc/L de agua (250-500 ml/ha)	Estimulación de brotación. Aplicar en estado de pelillo para iniciar el llenado.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN

"Induce resistencia sistémica". Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo). **Máximo potencial genético.** Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula. Nutrientes altamente asimilables.



VÍA FOLIAR

PRESENTACIONES

250 ml, 500 ml, 1 Litro y 4 Litros