



VÍA SUELO



VÍA FOLIAR

PRESENTACIONES

500 ml, 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros

NUTRIGROW
Fósforo
Fertilizante líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	%P/V
Nitrógeno (N).....	6%
Fósforo (P2O5).....	31%
Potasio (K2O).....	6%
Boro (B).....	0,12%
Activadores enzimáticos	1,30%
Ácidos Orgánicos	10,00%



NUTRIGROW FOSFORO contiene gran concentración de fósforo con potasio, nitrógeno y microelementos, de rápida asimilación estimulando el crecimiento de diferentes estructuras vegetales (brotes, flores, raíces, etc.), además acelera el engrosamiento de tallos e induce una mejor floración. Favorece las condiciones de resistencia a enfermedades y al estrés.

NUTRIGROW FOSFORO es un complejo que proporciona un arranque vigoroso, permite mejorar las condiciones del suelo, incrementa el desarrollo de la microflora bacteriana. Evita la formación de compuestos insolubles.

NUTRIGROW FOSFORO incrementa la capacidad de intercambio catiónico lo que permite una eficaz absorción de nutrientes por las plantas. Favorece la síntesis de proteínas, así como la formación de carbohidratos y materiales transportadores de energía como la clorofila, con lo que ayuda a la formación de nuevos brotes.

Su efecto se potencia al ser usado en una relación 20:1, aplicando por cada 20 L de **NUTRIGROW FOSFORO**, 1L de **RAADIX**. La alta concentración de fósforo altamente asimilable, beneficia el ciclo fenológico inicial de los cultivos generando un gran impulso en su desarrollo, en las etapas de floración y fructificación.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/HA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Maíz (Zea mays), arroz (Oryza sativa), fréjol (Phaseolus vulgaris).	50 cc/L. de agua (20 L./ha)	De 5 a 10 días después de la emergencia.	Edáfico (fertilizante y/o drench)
Caña de Azúcar (Saccharum officinarum), Cacao (Theobroma cacao).	50 cc/L. de agua (20 L./ha)	Después del corte en el primer riego y al inicio de temporada de lluvias.	
Agua de Persea americana), café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis), manzana (Malus pumila), papaya (Carica papaya), piña (Ananas comosus), fresa (Fragaria).	50 cc/L. de agua (20 L./ha)	Al suelo desde el inicio del cultivo y durante el desarrollo hasta pre floración. Repetir cada 30 días.	
Papa (Solanum tuberosum), pimiento (Capsicum annum), tomate (Lycopersicon esculentum).	50 cc/L. de agua (20 L./ha)	Cada semana, 5 litros en etapa temprana y 10 litros parador más vigor a la planta, a partir de floración y hasta término de cosecha.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica"

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.