

+ AMINOÁCIDOS

NUTRIFYL

CRECIMIENTO

30-3-3 + Micros

Fertilizante
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	% P/P
Nitrógeno (N)	30%
Fósforo (P ₂ O ₅)	3%
Potasio (K ₂ O)	3%
Magnesio (MgO)	0,49%
Boro (B)	0,11%
Hierro (Fe)	0,040%
Cobre (Cu)	0,013%
Zinc (Zn)	0,23%
Manganeso (Mn)	0,074%
Aminoácidos	3,5%



NUTRIFYL CRECIMIENTO se recomienda para lograr altos rendimientos en los cultivos. Complementa la fertilización al suelo, especialmente en la fase de crecimiento donde la demanda de Nitrógeno es mayor a la tasa de absorción.

NUTRIFYL CRECIMIENTO tiene un buen balance de nitrógeno para obtener un desarrollo más vigoroso del cultivo, mejorando la calidad, generando un mejor follaje. Estimula los procesos de producción de cultivos de alto rendimiento. Ayuda a un cultivo sometido a condiciones adversas (ej: sequía, exceso de humedad, ataque de plagas, exceso de dosis de fitosanitarios).

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (Solanum tuberosum).	1kg/ha	Inicio etapa de Crecimiento. Foliar	Via Foliar
Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa).		Inicio etapa de Crecimiento. Foliar	
Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica).		Aplicar desde la fase de desarrollo del cultivo. Foliar	
Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis).		Desde el establecimiento del cultivo. Foliar	
Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).		Desde el establecimiento del cultivo. Foliar	
Maiz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).		Inicio etapa de Crecimiento. Foliar	
Frutilla (Fragaria), Sandía (Citrullus vulgaris), Papaya (Carica papaya), Platano (Musa spp).		Inicio etapa de Crecimiento. Foliar	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica"


Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.



VÍA FOLIAR

PRESENTACIONES

500 Gramos y 1 kilo