

+ AMINOÁCIDOS

NUTRIFYL

ENGROSE

4-2-41 + Micros

Fertilizante
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	% P/P
Nitrógeno (N)	4%
Fósforo (P ₂ O ₅)	2%
Potasio (K ₂ O)	41%
Magnesio (MgO)	1,39%
Boro (B)	0,113%
Hierro (Fe)	0,040%
Cobre (Cu)	0,013%
Zinc (Zn)	0,227%
Manganeso (Mn)	0,074%
Molibdeno (Mo)	0,0109%
Aminoácidos	3,5%



NUTRIFYL ENGROSE es un producto desarrollo para las etapas de floración y sobre todo llenado de fruto, de fácil aplicación, incrementa la resistencia al frío o las heladas favoreciendo además la fructificación, maduración y calidad de los frutos.

FERTIGROW ENGROSE ayuda a resistir los ataques de enfermedades al fortalecer los mecanismos de resistencia naturales de la planta; tiene gran impacto en la calidad final del cultivo; refuerza la epidermis de la célula, permitiendo tener tallos fuertes que resisten el ataque de patógenos y plagas, cuya acción produce gran incidencia en el balance de agua y contribuye con el potencial osmótico, turgencia de células de estomas y procesos de transporte a través de membranas. Es vital para la fotosíntesis, con un efecto inmediato en la provisión de energía para el crecimiento vegetativo y la producción de la planta.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSES / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (Solanum tuberosum).	1kg/ha	Luego de la formación de flores cada 15 días. Foliar	Via Foliar
Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa).		En las fases finales del cultivo cada 15 días. Foliar	
Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica).		En las fases finales del cultivo cada 15 días. Foliar	
Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis).		Luego del cuaje de flores cada 15 días. Foliar	
Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).		Luego del cuaje de flores cada 15 días. Foliar	
Maíz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).		Aplicar a la formación de espigas cada 15 días. Foliar	
Frutilla (Fragaria), Sandía (Citrullus vulgaris), Papaya (Carica papaya), Platano (Musa spp.).		En las fases finales del cultivo. Foliar	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica"

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.



VIA FOLIAR

PRESENTACIONES

500 Gramos y 1 kilo