

+ AMINOÁCIDOS

**NUTRIFYL**

**FLORACIÓN**

**12-17-8 + Micros**

Fertilizante  
"APLICACIÓN FOLIAR"

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| Componentes    | % P/P  |
|----------------|--------|
| Nitrógeno (N)  | 12%    |
| Fósforo (P2O5) | 17%    |
| Potasio (K2O)  | 8%     |
| Magnesio (MgO) | 2,9%   |
| Boro (B)       | 0,11%  |
| Hierro (Fe)    | 0,040% |
| Cobre (Cu)     | 0,013% |
| Zinc (Zn)      | 0,23%  |
| Manganeso (Mn) | 0,10%  |
| Aminoácidos    | 3,5%   |



Es un fertilizante con alto contenido de fósforo, de acción rápida en la planta recomendado para las etapas reproductivas en los principales cultivos. Ayuda a prevenir y corregir deficiencias de absorción de fósforo en la etapa de floración. Favorece la síntesis de proteínas, así como la formación de carbohidratos y materiales transportadores de energía como la clorofila, dando como resultado una abundante y vigorosa formación de brotes florales. Optimiza los procesos de floración y cuajado.

**INSTRUCCIONES DE USO**

| CULTIVO                                                                                       | DOSES / 200 LITROS DE AGUA | EPOCA DE APLICACIÓN                                                        | VIA DE APLICACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Papa (Solanum tuberosum).                                                                     | 1kg/ha                     | Desde pre floración cada 15 días. Foliar                                   | Via Foliar        |
| Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa).                                      |                            | En la fase de pre floración cada 15 días. Foliar                           |                   |
| Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica).       |                            | En la fase de pre floración cada 15 días. Foliar                           |                   |
| Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis).                    |                            | Aplicar en el inicio de la fase floración del cultivo cada 15 días. Foliar |                   |
| Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).      |                            | Antes del cuaje de flores cada 15 días. Foliar                             |                   |
| Maiz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).                |                            | Aplicar a la formación de espigas cada 15 días. Foliar                     |                   |
| Frutilla (Fragaria), Sandía (Citrullus vulgaris), Papaya (Carica papaya), Platano (Musa spp). |                            | En la etapa de pre floración del cultivo. Foliar                           |                   |

**TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:**

**"Induce resistencia sistémica"**

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

**Máximo potencial genético.**

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

**Absorción vía estoma cutícula.**

Nutrientes altamente asimilables.



VÍA FOLIAR

**PRESENTACIONES**

**500 Gramos y 1 kilo**