



PRESENTACIONES

250 ml, 500 ml, 1 Litro y 20 Litros



QUELAGROW

Calcio-Boro-Zinc

Fertilizante inorgánico líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPONENTES	% P/P
Cálcio (CaO)	8%
Boro (B)	4%
Zinc (Zn)	5%



QUELAGROW CALCIO-BORO-ZINC es un fertilizante líquido de rápida acción con alta concentración de calcio, boro y zinc, complejado con ácidos carboxílicos, con un balance adecuado para el crecimiento de los cultivos y por lo tanto para la producción óptima.

QUELAGROW CALCIO-BORO-ZINC fortalece la estructura de las paredes celulares, mejora el transporte de azúcares a través de la célula, ayuda en la síntesis de sustancias que permiten el crecimiento de la planta y de varios sistemas enzimáticos. Permite obtener una adecuada floración, cuajado y llenado de frutos al momento de las cosechas.

QUELAGROW CALCIO-BORO-ZINC permite obtener una adecuada floración, cuajado y llenado de frutos al momento de las cosechas.

- Calcio forma compuestos que son parte de las paredes celulares. Esto fortalece la estructura de la planta.
- Boro mejora el transporte de azúcares a través de la célula. Se puede obtener así mejor calidad y rendimiento de los cultivos.
- Zinc activa las hormonas naturales de la planta, ayuda en la síntesis de sustancias que permiten el crecimiento de la planta y de varios sistemas enzimáticos.

Debido a su formulación produce un efecto inductor de síntesis de fitoalexinas en los vegetales, lo que promueve la activación de mecanismos de defensa natural contra agentes patógenos.

QUELAGROW CALCIO-BORO-ZINC no se separa al combinarse con la mayoría de pesticidas u otros fertilizantes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en un envase aparte

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del período de floración, repetir cada 15 días.	Vía Foliar
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Haba (<i>Vicia faba</i>), Brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), Frutilla (<i>Fragaria</i>), Fimienta (<i>Capsicum annuum</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del período de floración, repetir cada 15 días.	
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Café (<i>Coffea arabica</i>), Naranja (<i>Citrus sinensis</i>), Platano (<i>Musa spp.</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del período de floración, repetir cada 15 días.	
Aguaate (<i>Persea americana</i>), Manzana (<i>Malus pumila</i>), Tomate de Arbol (<i>Solanum betaceum</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del período de floración, repetir cada 15 días.	
Maíz (<i>Zea mays</i>), Arroz (<i>Oryza satina</i>), Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del período de floración, repetir cada 30 días.	
Sandia (<i>Citrus vulgaris</i>), Papaya (<i>Carica</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del período de floración, repetir cada 15 días.	
Piña (<i>Ananas comosus</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del período de floración, repetir cada 30 días.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN

- ✓ **"Induce resistencia sistémica".** Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).
- ✓ **Máximo potencial genético.** Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).
- ✓ **Absorción vía estoma cutícula.** Nutrientes altamente asimilables.