




VÍA FOLIAR

PRESENTACIONES

250 cc, 500 cc, 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros



Fertilizante líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	% P/V
Nitrógeno (N)	3%
Potasio (K ₂ O)	21%
Boro (B)	59 ppm
Cobre (Cu)	1,42 ppm
Hierro (Fe)	3,54 ppm
Manganeso (Mn)	283 ppm
Zinc (Zn)	3,78 ppm
Complejo Hormonal	650 ppm
Activadores enzimáticos	0,50%
Aminoácidos	1%
Polisacáridos y monosacáridos	5%



QUELAGROW POTASIO contiene un complejo hormonal molecularmente estructurado con gran concentración en potasio altamente asimilable, potencializado con boro, aminoácidos para darle una mayor sinergia además de activadores enzimáticos, ácidos orgánicos que promueven una mayor y rápida asimilación.

QUELAGROW POTASIO es un producto desarrollado para las etapas de llenado de fruto. Su acción produce gran incidencia en el balance de agua y contribuye con el potencial osmótico, turgencia de células y estomas así como procesos de transporte a través de membranas. En los cultivos minimiza el estrés por falta de agua.

QUELAGROW POTASIO es vital para la fotosíntesis, estimula y regula el crecimiento con un efecto inmediato en la provisión de energía para el crecimiento vegetativo y la producción de la planta, favoreciendo además la fructificación, maduración y calidad de los frutos.

QUELAGROW POTASIO Ayuda a resistir los ataques de enfermedades al fortalecer los mecanismos de resistencia natural de la planta. Incrementa la resistencia al frío o las heladas; tiene gran impacto en la calidad final del cultivo, refuerza epidermis de la célula, permitiendo tener tallos fuertes que resisten el ataque de patógenos y plagas.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/HA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Maíz (Zea mays), Arroz (Oryza sativa)	500 cc a 1 Litro	En floración y en llenado de grano.	Vía Foliar
Caña de Azúcar (Saccharum officinarum), Cacao (Theobroma cacao).	500 cc a 1 Litro	Después del corte en el primer riego y al inicio de temporada de lluvias.	
Aguacate (Persea americana), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis), Manzana (Malus pumila), Fresa (Fragaria), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).	500 cc a 1 Litro	Desde prefloración y durante la cosecha cada 15 días hasta la salida del cultivo.	
Pimiento (Capsicum annum), Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa), Haba (Vicia faba), Zanahoria (Daucus carota), Brocoli (Brassica oleracea var. italica).	500 cc a 1 Litro	Desde el trasplante con intervalos de 15 días.	
Papa (Solanum tuberosum).	500 cc a 1 Litro	En la etapa de engrose por dos ocasiones cada 15 días.	
Papaya (Carica papaya), Plátano (Musa spp).	500 cc a 1 Litro	Cada 15 días para incrementar el peso y azúcares, desde un mes antes de inicio de floración, hasta la salida del cultivo.	
Piña (Ananas comosus).	500 cc a 1 Litro	Desde el inicio de desarrollo, cada 30 días. A partir de la inducción, hacer aplicaciones cada 15 días.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica".

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.