

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPONENTES	% P/V
Zinc (Zn)	5%
Manganeso (Mn)	3%



QUELAGROW ZINC-MANGANESO es un complejo nutricional que combina dos nutrientes esenciales para los cultivos, Zinc y Manganeso quelatados con ácidos carboxílicos, aminoácidos y vitaminas.

La acción principal de **QUELAGROW ZINC-MANGANESO** es prevenir y corregir deficiencias en la absorción de zinc y manganeso por parte de raíces y hojas.

Su aplicación regular favorece la conversión de azúcares y la fotosíntesis para una eficiente producción. Regula y actúa en una amplia gama de procesos tales como la fotosíntesis, la producción de la hormona de crecimiento y el alargamiento entre nudos, la respiración y la asimilación de nitrógeno. Mejora el cuaje de fruto, con lo que se garantiza una mejor cosecha.

Estimula la germinación, maduración y participa activamente en el metabolismo del fósforo, calcio y nitrógeno, incrementando su disponibilidad. Tiene efectos positivos en la germinación del polen, el crecimiento del tubo polínico, el alargamiento celular en la raíz y la resistencia a patógenos de la misma.

Debido a su formulación produce un efecto inductor de síntesis de fitoalexinas en los vegetales, lo que promueve la activación de mecanismos de defensa natural contra agentes patógenos.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	Via Foliar
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>), Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Haba (<i>Vicia faba</i>), Brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>), Frutilla (<i>Fragaria</i>), Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>),	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), Café (<i>Coffea arabica</i>), Naranja (<i>Citrus sinensis</i>), Platano (<i>Musa spp.</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Aguacate (<i>Persea americana</i>), Manzana (<i>Malus pumila</i>), Tomate de Arbol (<i>Solanum betaceum</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Maíz (<i>Zea mays</i>), Arroz (<i>Oryza satina</i>), Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Sandía (<i>Citrus vulgaris</i>), Papaya (<i>Carica</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Piña (<i>Ananas comosus</i>).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN

- ✓ **"Induce resistencia sistémica"**. Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).
- ✓ **Máximo potencial genético**. Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).
- ✓ **Absorción vía estoma cutícula**. Nutrientes altamente asimilables.



PRESENTACIONES

5, 10 Y 20 Litros