



VÍA FOLIAR

#### PRESENTACIONES

120 cc, 250 cc, 500 cc, 1litro



Fertilizante líquido soluble  
"APLICACIÓN FOLIAR"

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| COMPONENTES                  | %P/V   |
|------------------------------|--------|
| Acido Carboxílico AATC ..... | 5,40%  |
| Acido Fólico .....           | 0,100% |
| Potasio (K2O) .....          | 2,550% |



**RELAXGROW** es un potente bioestimulante sistémico y desestresante vegetal que potencializa las reservas fisiológicas de las plantas, mejorando la calidad de los cultivos. Permite que se exprese el potencial genético de la planta, gracias a la acción generadora de aminoácidos específicos.

Con **RELAXGROW**, los cultivos incrementan los procesos de respiración y síntesis de clorofila, con lo que soportan de mejor manera los periodos de estrés. Se obtiene un aumento del contenido de proteínas, carbohidratos, vitaminas y hormonas de crecimiento. Estos componentes en conjunto estimulan los procesos normales y vitales de las plantas generando altos rendimientos.

**RELAXGROW** trabaja a nivel celular con la capacidad de regular la producción de aminoácidos específicos (prolina y cisteína) dentro de la planta, ya que son aminoácidos naturales, ligados a un medio de defensa contra condiciones adversas de estrés y/o procesos oxidativos celulares.

En plantas con estrés **RELAXGROW** desempeña las siguientes funciones:

- Ayuda a retener la humedad interna de la célula, esto evita la pérdida de agua por altas temperaturas.
- Provee resistencia a bajas temperaturas. Reduce el punto de congelación y evitar daño.
- Evita la pérdida de agua debido a la mayor concentración de sales. Suelos salinos.
- Ayuda a absorber agua a pesar de la fuerte presión negativa generada por las sales del suelo.
- Favorece la polinización bajo temperaturas adversas.

**RELAXGROW** está indicado para ser aplicado en etapas de estrés donde se tiene un mayor desgaste energético como: desarrollo, floración, y maduración.

#### INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO                                                                                                                                                                                          | DOSIS / 200 LITROS DE AGUA | EPOCA DE APLICACIÓN                                                                                                                                     | VIA DE APLICACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Papa (Solanum tuberosum).                                                                                                                                                                        | 500cc                      | Realizar tres aplicaciones:<br>1.- Aplicación 45 días después de la siembra<br>2.- Aplicación Inicio de Floración<br>3.- Aplicación en plena floración. | Via Foliar        |
| Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa), Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica), Frutilla (Fragaria), Pimiento (Capsicum annum). | 500cc                      | Realizar dos aplicaciones:<br>1.- Aplicación 15 días después de la siembra o trasplante<br>2.- Aplicación Inicio de Floración                           |                   |
| Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis), Platano (Musa spp).                                                                                                   | 500cc                      | Realizar dos aplicaciones:<br>1.- Aplicación prefloración<br>2.- Inicio de Cuajado                                                                      |                   |
| Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).                                                                                                         | 500cc                      | Realizar dos aplicaciones:<br>1.- Aplicación prefloración<br>2.- Inicio de Cuajado                                                                      |                   |
| Maiz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).                                                                                                                   | 500cc                      | Realizar dos aplicaciones:<br>1.- Aplicación después del trasplante<br>2.- Aplicación en floración                                                      |                   |

#### TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

##### "Induce resistencia sistémica".

Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

##### Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

##### Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.