

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPONENTES	% P/V
Boro (B)	6%
Molibdeno (Mo)	3%



QUELAGROW MOLIBDENO-B tiene alta tecnología de quelatación. Además contiene un complejo de activadores enzimáticos que estimulan y aumentan la resistencia de las plantas a condiciones adversas.

QUELAGROW MOLIBDENO-B contiene alta concentración de boro y molibdeno, nutrientes esenciales para las plantas, provocando un aumento considerable de los niveles productivos finales.

El complejo participa en la producción de la enzima nitrato reductasa, la cual envía la señal a la planta para detener el periodo vegetativo y a su vez comenzar el periodo reproductivo. Promueve la división y elongación de las células, la fuerza de la pared celular, la polinización, floración, producción de semillas.

Debido a su formulación produce un efecto inductor de síntesis de fitoalexinas en los vegetales, lo que promueve la activación de mecanismos de defensa natural contra agentes patógenos.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (Solanum tuberosum).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	Via Foliar
Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa), Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica), Frutilla (Fragaria), Pimiento (Capsicum annum),	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis), Platano (Musa spp).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Maíz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Sandía (Citrullus vulgaris), Papaya (Carica papaya).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Piña (Ananas comosus).	2,5 cc/L de agua (500 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN

- ✓ **"Induce resistencia sistémica".** Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).
- ✓ **Máximo potencial genético.** Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).
- ✓ **Absorción vía estoma cutícula.** Nutrientes altamente asimilables.



PRESENTACIONES

250 cc, 500 cc, 1 Litro y 20 Litros.