

NUTRYGROW
Raadix

Fertilizante líquido soluble
"APLICACIÓN FOLIAR"

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Componentes	% P/V
Nitrógeno (N)	7,58%
Fósforo (P2O5)	15,54%
Potasio (K2O)	6,68%
Zinc (Zn)	2727 ppm
Manganeso (Mn)	2955 ppm
Complejo Hormonal	1600 ppm
Aminoácidos	6%
Ácidos Húmicos	6%



RAADIX NUTRIGROW es un bioestimulante líquido de rápida acción con alta concentración de fósforo, potasio y microelementos. Además, posee una alta carga hormonal. Complejado con ácidos orgánicos, diseñado para inducir y estimular el desarrollo radicular y el engrosamiento de tallos en la producción de plántulas, trasplantes y estacas ya enraizadas.

RAADIX NUTRIGROW favorece la aparición de raíces primarias, también estimula la formación de raíces laterales. Puede ser usado en la multiplicación asexual de plantas. Su aplicación permite obtener plantas más vigorosas al incrementar la densidad de las raíces y favorecer el desarrollo de tallos y hojas gracias a su alto contenido de fósforo. Por su gran solubilidad puede ser una fuente de fósforo en las primeras etapas del cultivo.

Debido a su formulación produce un efecto inductor de síntesis de fitoalexinas en los vegetales, lo que promueve la activación de mecanismos de defensa natural contra agentes patógenos.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (Solanum tuberosum).	2,5 cc / Litro. 1 Litro / ha	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 15 días.	Via Foliar
Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa), Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica), Frutilla (Fragaria), Pimiento (Capsicum annum).	2,5 cc / Litro. 1 Litro / ha	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 15 días.	
Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis), Platano (Musa spp).	2,5 cc / Litro. 1 Litro / ha	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 15 días.	
Aguacate (Persea americana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).	2,5 cc / Litro. 1 Litro / ha	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 15 días.	
Maiz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azúcar (Saccharum officinarum).	2,5 cc / Litro. 1 Litro / ha	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Sandía (Citrullus vulgaris), Papaya (Carica papaya).	2,5 cc / Litro. 1 Litro / ha	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 15 días.	
Piña (Ananas comosus).	2,5 cc / Litro. 1 Litro / ha	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	

TIENE TRIPLE GATILLO DE ACCIÓN:

"Induce resistencia sistémica".


Contienen activadores enzimáticos, (protección al cultivo).

Máximo potencial genético.

Resistencia a eventos estresantes (sequía, granizo u otro factor).

Absorción vía estoma cutícula.

Nutrientes altamente asimilables.



VÍA SUELO



VÍA FOLIAR

PRESENTACIONES

250 cc, 500 cc, 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros